

DESALGIN-JET

(K) 20

Algaképződést és habzást gátló vegyszer

A BAYROL DESALGIN-JET folyékony vegyszer megakadályozza az algák elszaporodását a medencevízben, segíti a zavarosságot okozó anyagok eltávolítását és az uszoda vizét átlátszóvá teszi. Klórt nem tartalmaz, biológiailag lebontható. **Megátolja a víz habzását.** A klóros vízfertőtlenítő eljárások szükséges tartozéka. Használható ellenáramoltató berendezéseknél és pezsgőfürdőknél.

A DESALGIN-JET hatóanyaga: kationos polimérek és habzásgátló vegyszerek.

Felhasználási javaslat

A termék kizárólag a fenti célra és a következőkben leírt módon használható.

A DESALGIN-JET csak az algák elszaporodását akadályozza meg. Az elszaporodott **algákat nem öli meg.** Az algákat csak BAYROL CHLORIFIX, BAYROL CHLORIFIX-COMPACT vagy BAYROL CHLORIKLAR adagolásával lehet elpusztítani (lásd a vegyszerek használatának tájékoztatóját).

Feltöltés előtt a medence falait és fenekét fertőtlenítés és egy védőréteg képzésének céljából **50-szeres hígítású** (200 ml DESALGIN-JET 10 liter vízhez) oldattal kenjük le vagy szórjuk be permetező berendezéssel és hagyjuk megszáradni.

Adagolás

- **Első alkalommal** (a medence feltöltése után):
 - 10 m³ medencevízhez 150 ml DESALGIN-JET.
- **Folyamatos adagolás** – hetenként 10 m³ medencevízhez legalább:
 - fedett uszodákban 30 ml DESALGIN-JET
 - szabadtéri medencéknél 50 ml DESALGIN-JET
- **Zivatar után vagy tartós nagy meleg esetén**, valamint abban az esetben, ha az úszómedencében sikos lerakódás képződik, gyakoribb adagolás szükséges, legfeljebb **hetenként**:
 - 10 m³ medencevízhez **egyszerre** 250 ml DESALGIN-JET,
 - vagy folyamatosan **hetenként kétszer** legalább:
 - fedett uszodákban (10 m³ medencevízhez) 30 ml DESALGIN-JET,
 - szabadtéri medencéknél (10 m³ medencevízhez) 50 ml DESALGIN-JET.
- **Algásodott medencéknél**
 - 10 m³ medencevízhez 250 ml DESALGIN-JET és
 - ezenkívül 200 g BAYROL CHLORIFIX granulátumot vagy esetleg 10 db BAYROL CHLORIKLAR tablettát kell adagolni (lásd a vegyszerek használatának tájékoztatóját).
- A CHLORIFIX granulátumot a medencék leginkább algásodó helyeire (a sarkokba, a szögletekbe) adagoljuk. Fóliás és festett medencékbe a granulátum nem adagolható. Csak oldatban lehet adagolni (ajánlott az 1-5%-os oldat). A CHLORIKLAR tablettákat úszóadagolóval kell a medencevízbe juttatni.
- A vegyszereket lehetőleg abban az időpontban kell adagolni, amikor a medencét nem használják (este).