

**STABICHLORAN****(K) 20****Klór lebomlását gátló vegyszer**

A BAYROL STABICHLORAN vegyszer ( granulátum ) adagolásával az uszodavízben **a klór idő előtti lebomlását lehet meggátolni**. A vízkezelő vegyszerekben a víz fertőtlenítésére adagolt klórvegyületek ( például a CHLORILONG, CHLORIKLAR, CHLORIFIX ) az erős napsugárzás vagy a nagy meleg hatására gyorsabban bomlanak le, mint erre a hatásos vízfertőtlenítési eljárásnál szükség lenne. Ezzel főleg klórvesztés keletkezik, ezt STABICHLORAN-adagolással meg lehet gátolni, egyúttal **a víz pH-értékét is állandósítani lehet**. A klóros vízfertőtlenítő eljárások szükséges tartozéka.

*A STABICHLORAN hatóanyagai: izocianursav és nátriumkarbonát.*

**Felhasználási javaslat**

A vegyszer kizárólag a fent megjelölt célra, a következőkben leírt módon használható.

*Megjegyzés: Az adagolás csak arra az esetre vonatkozik, ha kizárólag BAYROL CHLORILONG, CHLORIKAR vagy CHLORIFIX vegyszereket használnak, amelyekben a klór stabilizálva van.*

**Adagolás****• Első adagolás**

A fent említett klórvegyületek adagolása után a nyári időszakban vagy beltéri fürdőmedencéknél a fűtési idényben:

**10 m<sup>3</sup> medencevízre 200 gramm STABICHLORAN granulátumot közvetlenül a medencébe kell adagolni.**

**• További adagolás**

Friss víz pótlásánál:

**1 m<sup>3</sup> friss vízhez 10 gramm STABICHLORAN granulátumot közvetlenül a medencébe kell adagolni.**

- A lefőlözőedényes ( szkimmeres ) medencéknél a szkimmerbe, a feszített víztükrű medencéknél a pótvízartályba is lehet STABICHLORAN-granulátumot adagolni.
- A STABICHLORAN-granulátum az adagolás után 1-2 nappal lesz teljesen hatásos. Hatását a medencevíz használatának egész időtartama alatt megtartja, abban az esetben, ha a friss víz pótlásánál is rendszeresen adagolják a vegszert.